



Terapias Oxigenativas 3



teroxi.com/dto



Protocolo A

Protocolo A

Protocolo A: como Amateur o Principiante

El protocolo A, o protocolo Amateur o principiante, es un protocolo para personas que se inician en estos tratamientos, inseguras o dudosas, para problemas menores o también para mantenimiento general.

Las gotas se activan siempre en relación 1:1, añadiendo 100-200 ml de agua para diluir posteriormente.

Protocolo A

Antes de iniciar cualquier protocolo, comprobamos primero la compatibilidad (regla general 12) para evitar efectos adversos.

- **1.º día:** Antes de dormir. 3 gotas activadas (en relación 1:1) añadiendo 100 a 200 ml de agua, el primer día de tratamiento.
- **2.º día:** Una hora después de desayuno 3 gotas activadas añadiendo 200 ml de agua, y otras 3 gotas activadas añadiendo 100-200 ml de agua, antes de dormir.
- **3.º día:** Se toman las dos dosis anteriores, después del desayuno y antes de dormir, añadiendo otra dosis una hora después de comer.

Se sigue con las mismas 3 dosis, una hora después del desayuno, comida y antes de dormir, el tiempo necesario del tratamiento.

Protocolo A

Este protocolo es apto para ser aplicado a largo plazo y también sirve de mantenimiento.

	1.º día	2.º día	3.º día
Desayuno (1 h. después)		3 gotas	3 gotas
Comida (1 h. después)			3 gotas
Antes de acostarse	3 gotas	3 gotas	3 gotas



Protocolo B



Protocolo B

Equivalente al antiguo protocolo 1000

El protocolo B, o protocolo Básico, es el que más se utiliza y es equivalente al protocolo 1000 de Jim Hamble.

Las gotas se activan siempre en relación 1:1, añadiendo de 100 a 200 ml de agua para diluir posteriormente.

Protocolo B

Antes de iniciar cualquier protocolo, comprobamos primero la compatibilidad (regla general 12) para evitar afectos adversos.

El propósito del protocolo B es llegar a tomar de forma cómoda dosis de 3 gotas activadas cada hora, durante 8 horas diarias (ó más), durante 3 semanas seguidas. ¡Esto hace un total de 24 gotas al día!

Protocolo B

Habitualmente se comienza con una dosis baja de 6 gotas diarias activadas, añadiéndolas a una botella de 1 a 1.5 litros de agua, durante los 3 primeros días; después se aumenta la dosis a unas 12 gotas activadas, añadiéndolas a una botella de 1 a 1.5 litros de agua, durante los próximos 4 días; después hasta 18 gotas diarias, añadiéndolas a una botella de 1 a 1.5 litros de agua, durante 7 días, y finalmente hasta 24 gotas, añadiéndolas a una botella de 1 a 1.5 litros de agua, durante un período de 7 días más. La dosis diaria siempre debe tomarse a lo largo del día, dividida de 8 a 12 partes (pueden hacerse marcas en la botella).

Protocolo B

Parecido a
esta botella



Protocolo B

Es recomendable activar la dosis diaria correspondiente cada mañana, y añadirla en una botella de 1 a 1.5 litros de agua e ir bebiendo cada hora un poco, durante el resto del tratamiento, cuya duración estándar es de tres semanas, o el tiempo necesario del tratamiento, hasta que se sienta recuperado.

Si se experimenta náuseas, se reducirá la dosis al nivel anterior.

Protocolo B

6 gotas: 3 días en una botella de 1 a 1.5 litros de agua.

12 gotas: 4 días en un botella de 1 a 1.5 litros de agua.

19 gotas: 7 días en un botella de 1 a 1.5 litros de agua.

24 gotas: 7 días en un botella de 1 a 1.5 litros de agua.

Protocolo B

Cuanto más enferma esté una persona, más lento tiene que ser el aumento de la dosis. Para una persona muy enferma se debe empezar por una dosis no mayor a 6 gotas en un día, e ir aumentando la dosis progresivamente.

La ventaja de prepararlo en una botella es que resulta más fácil de transportar y tomar.

Podemos señalar la dosis con exactitud con un marcador haciendo rayas en la botella, para repartirla bien a lo largo del día.

Protocolo B

Importante recordar:

1. El clorito siempre se mezcla con el activador, que está en otra botella.
2. Las dosis pequeñas de forma repetitiva son más efectivas, que las dosis grandes por la mañana y por la tarde.
3. Tome tanto CD como usted pueda, sin que le cause náuseas, diarrea o un malestar grave. En caso de malestar disminuya la dosis, pero siga con el tratamiento.
4. Evite suplementos de vitamina C y otros antioxidantes, como mínimo durante 2 horas antes o después de tomar CD, ya que reduce su efectividad.
5. Mantenga un programa de nutrición adecuado, para proteger su sistema inmunológico.
6. Puede cambiar el CD con agua de mar diluida, para recuperar la mineralización adecuada de su cuerpo.
7. Si después de un tiempo vuelve a repetir el protocolo, empiece desde el principio con 6 gotas diarias activadas, incrementando las dosis según bienestar.



Protocolo C

Protocolo C

Protocolo C. CDS (ANTIGUO PROTOCOLO 110)

El protocolo C, o protocolo CDS, es un protocolo universal, apto para la mayoría de los tratamientos, fácil de realizar y prácticamente carece de efectos secundarios no deseados, con lo cual sería el recomendado para la mayoría de los tratamientos.

Protocolo C

El protocolo C consiste en tomar 1 ml de CDS 0.3% (=3000 ppm) diluido en agua cada hora, durante 10 veces al día (por esta razón en algunos lugares también es llamado protocolo 110).

- Se añaden 10 ml de CDS 3000 ppm (o 100 ml de CDS 300 ppm) a 1 litro de agua, por día y se toma cada hora una parte, hasta terminar el contenido de la botella (de 8 a 12 tomas).
- En caso de enfermedad grave o peligro para la vida debe elevarse la dosis, lenta y progresivamente, en dosis separadas, tomadas a lo largo del día y según como se sienta, llegando hasta 30 ml por litro de agua.
- Si fuera necesario tomar más, hay que preparar otra botella de agua. Debe reducirse la dosis si se siente malestar o náuseas. No se deben superar 80 ml en 12 tomas diarias (6 ml/h para 100 Kg).

La duración del tratamiento sería el tiempo necesario, hasta que se sienta recuperado.



Protocolo D

Protocolo D

Protocolo D. DERMATOLÓGICO (PARA LA PIEL)

El protocolo D, o protocolo Dermatológico, utiliza siempre el CDS, ya que no deja residuos ácidos de ningún tipo, incluso se puede aplicar directamente sin diluir, ya que su PH es neutro y de esta manera puede ser aplicado durante más tiempo sin causar irritaciones.

Protocolo D

Si no se dispone de CDS, se puede utilizar el CD como alternativa, activando 25 gotas y añadiendo 60 ml de agua (dos onzas de agua) en un pulverizador de spray de aerosol. Cerrando bien el frasco, la mezcla tendrá una duración de una semana o incluso algo más, el color indicará el grado de concentración restante, manteniendo guardado en un lugar fresco y oscuro. Las gotas se activan siempre en relación 1:1.

Se llena un pulverizador de spray con CDS 0.3% (3000 ppm) y se aplica sobre la zona afectada. Se aplica directamente sobre la piel en caso de:

- heridas,
- quemaduras,
- otros problemas cutáneos.

Protocolo D

La solución no debe causar ardor o quemazón, más bien calma el dolor y el sangrado. Se puede repetir la operación varias veces al día (incluso 1 vez por hora). En algunos casos sensibles, como las mucosas, puede ser necesario rebajar la concentración con un poco de agua.

Protocolo D

Advertencias:

1. En el raro caso de sentir quemazón o ardor se recomienda lavar con agua.
2. Se desaconseja usar la antigua fórmula del MMS, ya que contiene ácido cítrico como activador, y se ha podido observar que cuando hay presencia de Citrobacter, la infección empeora, ya que ésta bacteria se nutre del citrato sódico sobrante de la reacción.
3. Si se desea mayor penetración a través de la piel se puede combinar con DMSO al 70%.
4. Para esto preparamos dos botellas de spray independientes, una con DMSO al 70% y otra con CDS o 25 gotas activadas de CD, para añadir a una botella de 60 ml de agua (como enuncié anteriormente). Haremos aplicaciones con ambas intercalando una y otra.
5. Lo más adecuado es el CDS 3000 ppm sin diluir y rociando en spray, por su PH neutro.
6. Se puede repetir la operación varias veces al día (hasta 1 vez por hora).



Testimonios Quemaduras

Testimonios Quemaduras

El ClO2 en quemaduras



El ClO₂ en quemaduras



Testimonios Quemaduras





Testimonios Quemaduras





Testimonios Quemaduras





"Estoy realmente asombrada por los resultados que he visto después de usar CDS en spray y seguir el protocolo C para tratar una quemadura de segundo grado causada por aceite de cocina."

Testimonios Quemaduras







Gracias