



Terapias Oxigenativas 11



teroxi.com/dto



Protocolo R

Protocolo R

Rectal con perilla:

El protocolo R, o protocolo Rectal con perilla, está destinado especialmente para el uso rectal, utilizando una perilla de goma de unos 100-150 mililitros aproximadamente.

1. Se activan 6 gotas de CD en un vaso.
2. Se añaden 150 ml de agua a temperatura corporal.
3. Absorber la solución con la perilla.
4. Se aplica vaselina o crema lubricante en la punta de la perilla.
5. Posteriormente, se introduce en el recto vaciando la perilla por completo y se retiene el líquido durante 3 minutos antes de evacuar.

Protocolo R



Protocolo R

Este protocolo es óptimo para fisuras anales, hemorroides y sobre todo en cáncer de próstata donde se aplica después de cada defecación.

Es un protocolo simple y sin efectos secundarios, pero muy eficaz.

Nota:

- Elimina la toxicidad y deshace las adherencias.
- Si se elimina toxicidad se reduce la fatiga.
- A través del colon tenemos acceso rápido al hígado a través de la vena porta.

Protocolo R

- El circuito sanguíneo pasa por el hígado cada 3 minutos.
- La mayoría de las enfermedades tienen su origen en el sistema gástrico intestinal.
- En la antigüedad ya lo sabían. Hasta los años 60 era común esta práctica.
- En la actualidad se ha perdido. Se ve como algo sucio.
- Método básico de curación hindú.

Protocolo R

- El intestino grueso es la “cloaca” de nuestro organismo. Deposición diaria, es salud intestinal.
- Exudación a través del colon al torrente sanguíneo. La toxicidad llega a órganos principales.
- Enfermedades crónicas y autoinmunes.
- Es imprescindible en terapias de detoxificación. Toxicidad bacteriana asociadas a parásitos muertos.



Protocolo S

Protocolo S

Sensible (Con dosis muy poco a poco)

El protocolo S, o protocolo Sensible, está pensado para las personas que no son capaces de ingerir CD de la misma manera que la mayoría. Hay casos reportados sobre todo en la forma del antiguo MMS (activado con ácido cítrico), donde puede haber efectos secundarios de diarrea o vómito en algunos casos. Existen algunas personas que parecen sensibles a una sola gota.

Protocolo S

Debido a la experiencia con niños que sufren autismo, se he podido averiguar que cuando hay parásitos grandes en el cuerpo, estos pueden no ser eliminados por el dióxido de cloro. Pero probablemente muchos parásitos sí son afectados por el dióxido y acaban volcando todos sus desechos de golpe a la persona infectada.

Son estas toxinas que causan malestar, ya que las personas que me escriben y que han hecho una desparasitación según mi protocolo, posteriormente son capaces de tomar dosis altas de CD sin ningún efecto secundario.

Protocolo S

- Se utiliza CDS al ser más llevadero y porque tiene menos efectos secundarios.

1. Para este protocolo, añade 1 ml de CDS para 500 ml de agua repartidos durante todo el día.
2. En el segundo día, utilice 2 ml de CDS en 1 litro de agua. Si no hay contratiempos (y normalmente no los hay) se puede incrementar a partir de aquí la dosis cada día, a 1 ml más por litro, hasta llegar a los 10 ml de CDS por litro de agua.

Protocolo S

Para esto, es importante saber que se sube paulatinamente la dosis, sin forzar en ningún momento el cuerpo. Si hay mucho cansancio, no se incrementa la dosis hasta que desaparezca. Ya que cada cuerpo es diferente, hay que adaptarlo a las necesidades de cada persona.

Una vez se llega a 10 ml por día, se mantiene hasta la próxima luna llena, cuando se empieza el protocolo de desparasitación. Para que tenga éxito, hay que seguirlo de la manera más exacta posible.



Protocolo S

Durante la desparasitación, se sigue con la misma dosis de CDS hasta la completa desaparición de los síntomas, el tiempo que sea necesario. El CDS no se acumula en el cuerpo, por ser un oxidante.



Protocolo T

Protocolo T

Terminal (enfermedades muy graves).

El protocolo T, o protocolo Terminal, está hecho para casos terminales, abandonados por la medicina convencional.

Este protocolo está basado en la experiencia de una madre que recuperó a su hija moribunda de 26 años. Cuando inició el tratamiento sólo tenía 44 kilos debido a los efectos de la quimioterapia. Era un caso desahuciado, pero aun así se recuperó por completo.

Protocolo T

- Día 1: 2 ml de CDS cada hora, 6 a 8 veces al día
- Día 2: 3 ml de CDS cada 2 horas.
- Día 3: 4 ml de CDS cada 2 horas.
- Día 4: 5 ml de CDS cada 2 horas.
- Día 5: 6 ml de CDS cada 2 horas.
- Día 6: 7 ml de CDS cada 2 horas.

Durante 5 semanas más, 7 ml cada 2 horas 6-8 veces al día.

Después, durante 4 semanas, 3 ml de CDS por hora, hasta remisión total.



Protocolo T

Nota:

En caso de no disponer de CDS se puede realizar también con CD, en relación de una gota de CD x 1 ml de CDS. Hay que tener en cuenta que, en dosis altas, el CD puede ocasionar diarrea.



Protocolo U

Protocolo U

Urgencia (Antiguo protocolo 6+6 de Clara)

El protocolo U, o protocolo Urgencias, también llamado de “Choque” o “6+6 de Clara” y variantes, es utilizado para tratamientos puntuales, no graves pero sí de urgencia, y en tratamientos infecciosos como por ejemplo la infección de orina (cistitis), infección de riñones, infección de oído, gastroenteritis, procesos febriles, intoxicación por alimentos, repentinos vómitos o diarrea, malestar severo sin causa aparente.

Protocolo U

Se puede aplicar sobre todo también en casos de dolor severo, donde se pueda observar el aumento rápido y repentino de la infección de una enfermedad desconocida.

1. Se toman 6 gotas de CD activado en 200 ml de agua y después de dos horas se repite, con otras 6 gotas más.
2. Posteriormente, se toman 3 gotas cada dos horas hasta completar unas 8 a 10 tomas al día. Debe haber al final del día una clara mejoría, en caso contrario consulte al médico de urgencias.

Protocolo U

- También hay que adaptarse a las tolerancias en cada caso, y se puede tomar como equivalente por cada gota de CD = 1 ml de CDS, disuelto en la misma cantidad de agua.

Hay que tener en cuenta que según la enfermedad se puede adaptar la dosis reduciéndola a 4x4, por ejemplo (en lugar de las 6 gotas señaladas más arriba).

El CDS generalmente tiene mejor tolerancia, sobre todo cuando se trata de problemas estomacales.



Gracias